



## （二種混合ワクチンによる副反応について）

全身症状として発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、下痢、めまい、関節痛等を認めることがあります。いずれも一過性で2～3日中に消失します。局所症状として発赤、腫脹、疼痛、硬結等を認めることもあります。いずれも一過性で2～3日中に消失します。ただし、硬結は1～2週間残存することがあります。

また、重大な副反応として、まれにショック、アナフィラキシーがあらわれることがあります。

## （接種前の注意事項）

1. **予診票**は、お子さんの**当日の体調**を知るための重要な資料です。医師は予診票をみて、接種ができるかを**判断**します。予診票は、**母子健康手帳**などを参考にしながら、保護者の方が**責任**をもって記入してください。  
**必ず、母子健康手帳を持参してください。**
2. 体温は医療機関で測って予診票に記入してください。

## （接種後の注意事項）

1. 接種を受けた当日はいつも通りの生活をして構いませんが、**激しい運動**はさけてください。
2. **入浴**は差し支えありませんが、接種部位を強くもんだり、こすったり、ひっかいたりしないでください。（**接種直後は、注射部位を軽く押さえる程度で結構です**）

## （予防接種ができない人）

1. 体温が**37.5℃以上**ある人。
2. **重篤な急性疾患**にかかっている人。
3. 予防接種の接種液の成分によって、**ひどいアレルギー**を起こしたことがある人。
4. その他、予防接種を行うことが**不適当な状態**にある人。（予診医師が判断しますが、**特別な病気**などで**かかりつけ医師**がある場合は、その医師に**事前に**予防接種を受けることができるかお尋ねください。）

## ○問い合わせ：

飯塚市	健幸保健課	地域保健係	（電話）0948-96-8615	（FAX）0948-25-8994
嘉麻市	子育て支援課	母子保健係	（電話）0948-62-5715	（FAX）0948-62-5691
桂川町	健康福祉課	健康推進係	（電話）0948-65-0001	（FAX）0948-65-0078